

LAMARDOR®

BEICAS

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 250 g/l (21%), tebukonazolas 150 g/l (13%)

Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui.

Sisteminio veikimo fungicidinis, triazolų grupės beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas vasarinių miežių, vasarinių kviečių, vasarinių kvietrugių ir avižų sėklos beicavimui.

Skirtas profesionaliajam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse.



ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1l, 5l, 10l, 15l.
 Registracijos Nr. 0335B/13
 Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
 Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
 Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas/registracijos savininkas:

Bayer AG
 Kaiser-Wilhelm-Allee 1
 51373 Leverkusen, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997.

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LAMARDOR yra sisteminio veikimo fungicidinis beicas, naikinantis ligų sukėlėjus tiek sėklos viduje, tiek paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos: protiokonazolas ir tebukonazolas yra sisteminio poveikio, todėl produktas naikina platų spektrą ligų sukėlėjų.

Augalai	Ligų sukėlėjai	Norma, l/t sėklos	Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/t sėklos
Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės (<i>Tilletia caries</i> , <i>T. foetida</i>) Dulkančiosios kūlės (<i>Ustilago tritici</i>) Pašaknio puviniai (<i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Fusarium</i> spp.) Daigų septoriozė (<i>Stagonospora nodorum</i>)	0,15	6,0-10,0
Vasariniai miežiai	Kietosios kūlės (<i>Ustilago hordei</i>) Dulkančiosios kūlės (<i>Ustilago nuda</i>) Pašaknio puviniai (<i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Fusarium</i> spp.) Juostuotoji dryžligė (<i>Pyrenophora graminea</i>) Tinkliškoji dryžligė (<i>Pyrenophora teres</i>)	0,2	6,0-10,0
Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai (<i>Fusarium</i> spp.)	0,2	6,0-10,0
Avižos	Pašaknio puviniai (<i>Fusarium</i> spp.)	0,2	6,0-10,0

PASTABOS

- Galima beicuoti tik skiestu produktu. Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama tiek, kad bendras tirpalo kiekis būtų 6-10 l/t sėklos.
- Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos tolygiai būtų padengtos beicu, naudoti rekomenduojamą normą.
- Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
- Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos.
- Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui.
- Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, beicuotos sėklos gali kiek vėliau pradėti dygti, tačiau tai javų augimui ir derliui neigiamos įtakos neturi.
- Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
- Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.**
- Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti ir laikyti pašaliniais asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui.
- Beicuotas sėklas pilti į didesnius kaip 25 kg maišus.
- Produktas yra labai koncentruotas, todėl rekomenduojama norma yra nedidelė. Sėklos išbeicuotos LAMARDOR būna ne tokios ryškios spalvos kaip sėklos, išbeicuotos senesnės kartos beicais. Dažai, panaudoti beico gamyboje, neturi jokios įtakos veikliųjų medžiagų, o kartu ir viso produkto, efektyvumui.

TIRPALO RUOŠIMAS

Beicuojama išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Prieš pradėdant tirpalo ruošimą, produktą reikia labai gerai suplakti pakuotėje. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną. Beicavimo metu tirpalas turi būti gerai maišomas. Būtina atidžiai sureguliuoti tiekimo sistemą ir darbo metu stebėti tirpalo dozavimą. Po darbo reikia kruopščiai išplauti beicavimo mašinos sistemą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Fungicido sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: protiokonazolas (DMI fungicidų grupė, triazolų cheminė grupė, FRAC kodas G1/3) ir tebukonazolas (DMI fungicidų grupė, triazolų cheminė grupė, FRAC kodas G1/3). Patogenų atsparumo išsivystymo rizika protiokonazolui ir tebukonazolui vertinama kaip vidutinė. Atsparumo išsivystymo rizikai sumažinti, beicą LAMARDOR būtina naudoti pagal rekomendacijas, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio ! Beicais sėklos apdorojamos tik sėklų ruošimo įmonėse.

Beicuojant sėklą būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034). Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt.

Beicuotos sėklos į sėjos vietą vežamos sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba maišuose su užrašu „beicuota“ ir nurodomas augalų apsaugos produkto pavadinimas.

Pilant ir sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti dulkių!

Higienos priemonės. Neštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0-+30°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniam asmeniui nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas (CO₂), putos, smėlis. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugančius kostiumus ir autonominius kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščių pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: veikliosios medžiagos protiokonazolas ir tebukonazolas priklauso triazolų cheminei grupei. Konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaldarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali

kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® – registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.