

Lintur[®] 70 WG

Linturas 70% v.d.g

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: **triasulfuronas 41 g/kg, dikamba 659 g/kg**

Produkto forma: **vandenyje disperguojančios granulės**

Lintur 70 WG – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Skirtas vienametėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose bei vasariniuose miežiuose naikinti.

Skirtas profesionaliam naudojimui.



DIRGINANTIS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Dirgina akis.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido)apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti

Pakuotė: **150 g, 1 kg**

Registracijos Nr.: 0140H/05

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija

Importuotojas ir platintojas:

UAB 'Kustodija', Laisvės pr. 117^A, 2022 Vilnius, tel. 85230 17 25.

UAB "Litagros chemija" Savanorių pr.173 Vilnius,tel.(8-5)2361690

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Lintur[®] 70 WG – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Skirtas vienametėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose bei vasariniuose miežuose naikinti. Lintur 70 WG sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos papildančios vieną kitą. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą, o triasulfuronas trikdo kvėpavimo procesus. Abi veikliosios medžiagos į augalą patenka per lapus bei šaknis.

Naikina vienmetes bei dvimetes dviskiltas piktžoles:

burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišių, bastučius, trikertę žvaginę, rugiagėles, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibujį lipiką, raudonžiedę notrelę, paprastąją gaivą, ramunes, dirvinę nemiršėlę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, pienes, dirvinę čiūžutę, garstukus, paprastąjį kežį, vienmetę notrą, gailiąją dilgėlę, dirvinę našlaitę, žvirbliarūtes.

Daugiametes piktžoles:

kiečius, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktinžiedę.

Naudojimas

Vasariniai miežiai ir kviečiai purškiami nuo dviejų lapelių iki krūmijimosi pabaigos.

Norma: 120-150 g/ha.

Žieminiai kviečiai ir rugiai purškiami nuo 3-4 lapelių iki krūmijimosi pabaigos.

Norma –150-180 g/ha.

Didesnės produkto normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės.

Geriausia purkšti, kai piktžolės turi 2-6 lapelius, o skrotelės yra mažesnės kaip 5 cm. Didesnėms ir gausiai išplitusioms piktžolėms naikinti, jei pasėlyje vyrauja kibieji lipikai ar daugiametės dviskiltės piktžolės, reikia naudoti didesnę produkto normą. Herbicidas geriau veikia, kai oro temperatūra yra nuo +10°C iki +25°C.

Pastabos: nerekomenduojama naudoti, kai temperatūra yra didesnė kaip +28°C arba numatomos šalnos. Stenkitės, kad produktas nepatektų ant greta augančių kultūrų. Nenaudokite herbicido kalkingose dirvose, kai rūgštingumas yra daugiau kaip 7,5, javams su ankštinių javų išėliu, paveiktiems šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų. Jei oras yra sausas, balandos gali turėti storą vaškinį sluoksnį, todėl skiedinys gali neprilipti ir produktas gali būti nepakankamai veiksmingas. Tokiu atveju reikia naudoti *Lintur 70WG* 100g/ha ir 0,5 l/ha *MCPA 750 SL* mišinį.

Fitotoksiškumas

Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.

Karencija

Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo turi praėti ne mažiau kaip 30 dienų.

Sėjomaina

Tinkamai naudojamas jokio poveikio kitiems sėjomainos augalams neturi. Jei pasėlis žūva, geriausia atsėti javus. Produkto naudojimo metais žieminių rapsą galima sėti tik dirvą suarus ne sekiau kaip 15 cm gyliu. Kitų metų pavasarį galima sėti visus dviskilčius augalus.

Tirpalo ruošimas

Vandens norma – 100-300 l/ha. Vešlesniems pasėliams naudokite daugiau vandens. Skiedinį galima ruošti purkštuvu rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiama produkto kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstantį kiekį vandens ir išmaišykite. Paruoštą skiedinį būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas. Skiedinys per ilgesnį laiką gali susisluoksniuoti, todėl prieš naudodami gerai išmaišykite.

Purškimo technika

Produktas skiedžiamas vandeniu ir purškiamas ant vegetuojančių augalų tinkamai sureguliuotu purkštuvu. Purkštuvai turi turėti gerą maišymo mechanizmą ir tinkamus purkštukus.

Purkštuvo plovimas

Baigę darbą vandeniu kruopščiai išplaukite purkštuvą. Po to ketvirtadalį purkštuvo pripilkite vandens, įpilkite vieną litrą chlorkalkių tirpalo ir 15 minučių pamaišę išpilkite. Purkštuvą ir nuimtus purkštukus dar kartą išplaukite švriu vandeniu.

Pastaba: naudojant Lintur 70 WG rekomenduojama 5 m apsauginė zona paviršinio vandens telkiniams apsaugoti, jei nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal Paviršinio vandens telkinių pakraščiu apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės.

Aplinkos apsauga

Neužterškite vandens, naudojamo laistyti ir namų ūkyje, vandens telkinių, nutekamojo vandens sistemų produkto likučiais.

Kenksmingumo pašalinimas

Tuščia pakuotė, produkto likučiai, likęs tirpalas sunaikinami pagal Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Darbų sauga

Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nekvėpuokite produkto dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir muilu. Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugos priemones. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Pirmoji pagalba

Nors truputį sunegalavę baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 852362052**

Avarijos atveju kreiptis į Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK +44 1484 538 444

Sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, užrakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip -10°C temperatūroje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrai krūvas.

Teisiniai aspektai

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.

Naudotojo atsakomybė

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.