

MAXIM STAR 025 FS

Beicas

Produkto forma: takus koncentratas

Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 18,75 g/l+ciprokonazolas 6,25 g/l

Maxim Star 025 FS - kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, vasariniams miežiams, pluoštiniais linams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

DĖMESIO!

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.

Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Agro AG, Bazelis, Šveicarija +41 61 3233333.

Pakuotė: 5 l, 200 l.

Registracijos Nr. 0077B/06.

Siuntos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.

Galiojimo laikas: 2 metai.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SIEKiant išvengti keliamos žmogaus sveikatai ir aplinkai rizikos būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas

Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas

Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklumą:

Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. 85 2420017

Gynėjų g. 16

LT – 01109 Vilnius

MAXIM STAR 025 FS

Maxim Star 025 FS - kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, vasariniams miežiams, pluoštiniais linams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Veikimo būdas

Fludijoksonilas yra ilgo veikimo kontaktinė medžiaga, kuri slopina ligų sukėlėjų (grybų) ląstelių energetinius procesus, nutraukdama grybienos augimą.

Ciprokonazolas pasižymi stipriu sisteminiu veikimu ir efektyvus nuo vidaus infekcijos.

Naudojimas

Žemės ūkio augalai	Ligos	Produkto norma, l/t
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų pašaknio ligos (<i>Cochliobolus sativus</i> , <i>Fusarium spp.</i>) Pavasarinis pelėsis (<i>Microdochium nivale</i>) Dulkančiosios kūlės (<i>Ustilago nuda</i>) Kietosios kūlės (<i>Tilleta tritici</i>) Daigų septoriozė (<i>Stagonospora nodorum</i>) Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>) ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais	1,0-1,5
Vasariniai miežiai	Daigų pašaknio ligos (<i>Cochliobolus sativus</i> , <i>Fusarium spp.</i>) Dulkančiosios kūlės (<i>Ustilago nuda</i>) Kietosios kūlės (<i>Tilleta hordei</i>) Dryžligės (<i>Pyrenophora spp.</i>) ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>) ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais	1,5-2,0
Pluoštiniai linai	Vytuliai (<i>Fusarium oxysporum f.lini</i>) Deguliai (<i>Collectotrichum lini</i>) Pasma (<i>Septoria linicola</i>)	1,5

Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 tonai grūdų. Prieš sėją būtina patikrinti daigumą.

Nenaudokite sėklos, kurios jau beicuotos, sudygę, pažeistos ir yra didesnio kai 16 proc. drėgnumo.

Fitotoksiškumas

Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.

Tirpalo ruošimas

Pusę reikiamo vandens kiekio supilti į indą, suplakti ir supilti apskaičiuotą produkto kiekį ir išmaišyti. Supilti likusį vandenį. Beicuojant tirpalą reikia nuolat maišyti. Tirpalą sunaudoti per 24 valandas.

Beicuotos sėklos saugojimas

Beicuotą sėklą galima laikyti metus, jei drėgmė neviršija 16 proc. Maišai su sėkla specialiai pažymimi ir laikomi atskirai nuo maisto ir pašarų. Sėklos negalima naudoti maistui ar gyvuliams šerti.

Darbų sauga

Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, drabužių ar į akis.

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, akių bei veido apsaugos priemones, mūvėkite gumines pirštines. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite.

Baigę darbą nusiprauskite vandeni su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo aprangą išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.

Pirmoji pagalba

Sunegalavę baikite darbą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite produkto etiketę.

Specifinis priešnuodis nežinomas, taikoma simptominė terapija.

Prarijus, negalima sukelti vėmimo. Gydomo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį zonda ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio. Duoti išgerti aktyvintos anglies ir vidurius laisvinančių vaistų.

Kenksmingumo pašalinimas

Tuščia pakuotė, nebereikalingi produkto likučiai, tirpalas, likęs po beicavimo, sunaikinamas pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Sandėliavimo sąlygos

Sandėliuojama gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo šviesos, užrakinamoje patalpoje. Atskirai nuo maisto ir pašarų ne žemesnėje kaip – 10°C ir ne aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Sandėliavimo trukmė – 2 metai neatidarytoje gamyklos pakuotėje.

Teisiniai aspektai bei naudotojo atsakomybė

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai sandėliuojamas ir naudojamas. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo dabartine patirtimi. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.

® registruotas Syngenta Crop Protection AG Šveicarija, Bazelis prekės ženklas

© Syngenta Crop Protection AG