

REGLONE SUPER

Reglone super 150 g/l v.t.

DEFOLIANTAS

Vandens tirpalas

Veiklioji medžiaga – dikvatas 150 g/l

Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti.

Skirtas profesionaliam naudojimui.



TOKSIŠKAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus.

Labai toksiškas įkvėpus.

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Toksiškas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti su dideliu kiekiu vandens.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 2 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotės: **5 l; 10 l**

Registracijos Nr.: **0088D/06**

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Tinka naudoti: 2 metus

Registracijos savininkas: **Syngenta Crop Protection AG**

Gamintojas: **Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija**

Importuotojai ir platintojai: **UAB "Litagros chemija" Savanorių pr.173 Vilnius, tel.(8-5)2361690**

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

REGLONE SUPER

Reglone super 150 g/l v.t.

DEFOLIANTAS

Vandens tirpalas

Veiklioji medžiaga – dikvatas 150 g/l

Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Reglone super – kontaktinio neatrankinio veikimo herbicidas-defoliantas, patenkantis į augalą per lapus. Stipriai veikia žaliuosius augalų audinius, tačiau produktas patekęs į dirvą praranda veiksmingumą. Augale fotosintezės metu skatina peroksido gamybą, kuris pažeidžia ląstelių membranas. Apdoroti augalai visiškai nudžiūva per 4-10 dienų, tai priklauso nuo apšvietimo stiprumo, oro temperatūros ir apdorojamo augalo rūšies. Saulėtu ir šiltu oru pirmieji augalų džiūvimo požymiai pasireiškia praėjus dviem valandom po purškimo. Apsiniaukusią ar vėsesnę dieną augalai džiūva ilgiau. Geriausia purkšti vidurdienį. Poveikis greitas ir patikimas net tuomet, kai tuoj po purškimo nulyja lietus. Produkto sudėtyje yra paviršiaus aktyviosios medžiagos, dėl kurios produktas geriau prilimpa prie lapų ir nenusiplauna lyjant. Defoliantas nudžiovina lapiją ir naikina dviskiltes piktžoles, pagreitina sėklų džiūvimą, palengviną derliaus nuėmimą.

Kultūra	Purškimo laikas	Produkto norma l/ha	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo dienomis
Morkų sėklojai	Purškiama antros eilės žiedyno pilno nokimo pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50%	2,5-3,0	6-8
Kopūstų sėklojai	Purškiama pilnos vaškinės sėklų brandos pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50%	2,0-3,0	5-10
Pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių sėklojai	Purškiama, kai paruduoja 20-40% kamuolėlių	4,0-6,0	8
Liucerna sėklai*	Purškiama, kai paruduoja 85-90% kamuolėlių	2,0-4,0	7
Raudonieji dobilai sėklai*	Purškiama, kai paruduoja 75-80% galvučių	3,0-4,0	5-7
Pašarinės pupos sėklai	Purškiama, kai apatinėse ankštyse sėklos geltonos, o rumbelis juodas	4,0-5,0	8-10
Vikių-avižių mišiniai sėklai, žirniai sėklai	Purškiama, kai paruduoja 75 % ankščių	2,0-3,0	6-8
Ridikų sėklojai	Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 55%	4,0-5,0	10
Bulvės sėklai	Purškiama baigiantis formuotis gumbams ir sustorėjus odelei	2,0	8-10
Turnepso sėklojai	Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų	3,0-4,0	6-7

	drėgnumas ne daugiau 45-50%		
Žieminiai ir vasariniai rapsai**	Purškiama kai yra subrendę 30% ankštaraų, sėklos tamsios ir kietos	2,0	7

*kūlenų nenaudoti pašarui

**išspaudų nenaudoti pašarui

PURŠKIMAS

Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purškite vidutiniais lašais. Vandens kiekis – 200-300 l/ha, slėgis – 2-3 atm.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą kiekį produkto. Į purkštuvą supilkite likusį reikiamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą išpurškite tą pačią dieną.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami naudokite tinkamus apsauginius drabužius, gumines pirštines, akių ir veido apsaugos priemones.

Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos ir į akis.

Neįkvėpkite tirpalo dulksnos.

Dirbdami nerūkykite, negerkite, nevalgykite.

Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą, nusiprauskite vandeniu ir muilu, išsiskalaukite burną, persirenkite kitais drabužiais.

PIRMOJI PAGALBA

Nors kiek sunegalavę kvieskite gydytoją.

Patekus ant odos, plaukite švariu vandeniu ir muilu, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu 10–15 min., nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Prarijus negalima sukelti vėmimo, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052. Informacija teikiama Syngenta Alarm Centre telefonu +44 1484 538 444.

PATARIMAI GYDYTOJUI

Gydytojais turi išplauti skrandį zonu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų šalinamo skysčio garų. Reikia išgerti 1l bentonito (7 proc.) suspensijos arba pusę stiklinės vandens su 2 ar 3 šaukštais aktyvintosios anglies ir laisvinamųjų vaistų, pvz., manitolio (20 proc.) arba MgSO₄ (200ml). Dar kartą išgerkite po 4-6 valandų, kol išmatose pasirodys absorbento. Jei būtina, duodama deguonies. Jei atliekama hemoperfuzija arba hemodializė, vartokite antikoagulintą, pvz., hepariną. Geriausia priemonė inkstams gydyti yra peritotinė dializė. Ypač atidžiai stebėkite skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą.

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO ŠALINIMAS

Tuščią pakuotę išplauti tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite.

Nenaudokite tuščios pakuotės kitais tikslais.

Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

SAUGOJIMAS

Laikykite originalioje, hermetiškoje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro ne didesnėje kaip + 30 ir ne mažesnėje kaip 0°C temperatūroje.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja gamyklos pakuotėje esančio produkto kokybę, tačiau neatsako už pasekmes jei jis netinkamai laikomas ir naudojamas.