



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *TORERO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2018 m. kovo 9 d. Nr. A1-107  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į Cheminova A/S 2018 m. vasario 5 d. paraišką:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Torero*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti trečiojo bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti trečiojo bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti trečiojo bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti trečiojo bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti žydėjimo–50 proc. išsivysčiusių ankštarų tarpsniuose (BBCH 60–75), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė